



Projet ANTARES

Un Agrosystème Vigne Innovant combinant Résistances variétales et Modes de conduite



COÛT TOTAL DU PROJET : 92930 € TTC

MONTANT DE LA SUBVENTION : 55758 € TTC



CONTEXTE

Vigne

Vitis vinifera, la vigne cultivée est très sensible aux agents pathogènes

→ IFT moyen 12 (87% mildiou et oïdium)

→ Nécessité de réduire les intrants (Ecophyto 2008-2018)

→ Opportunité : 2016 Autorisation de mise sur le marché de variétés résistantes à l'oïdium et au mildiou


**Développer des systèmes plus résilients
(maladies – changement climatique)**

OBJECTIFS

1. Planter et évaluer des dispositifs expérimentaux alliant **biodiversité variétale** et **modes de conduite**.
2. Meilleures connaissances des potentialités des **variétés résistantes** en **dispositifs innovants vers du zéro pesticide**.

→ Combiner un maximum de leviers préventifs : **résistance variétale**, **conduites culturales** moins favorables aux maladies (non taille vs cordon haut), **hétérogénéités spatiales** (génétique et conduites culturales)

→ Deux climats : septentrional et méditerranéen



2016

2017
2019

2019

ACTION 1 :

Implantation des
dispositifs
expérimentaux :
ANTARES

ACTION 2 :

Caractérisation des variétés
(plantes en pot et parcelle ANTARES)


ACTION 3 : Evaluation des
dispositifs implantés vis-à-
vis de maladies



Induits oidium/ CS-F1-Induit											
CS		134				Pri					
F1	F2	F3	F4	F1	F2	F3	F4	F1	F2	F3	F4
	2.91			4.97	7.85	4.87	2.95	4.92	3.11		
				5.14	6.53	6.95	7.40				
	1.36	1.5						0.71	1.04	1.11	
	2.22	2.23	2.05	2.02	3.05	3.6	4.25	1.52			
	3.1	3.71		4.91	4.9			3.93	6.6	6.4	
	-1	-2.6	-1.7	-1.8	-1.4	-4.2	-4.5	-2.6	-2.1	-3.4	-3.3
	1.86	1.88		-1.3	-1.7			-2.4	-1.9	-1.7	
	1.21			2.44	2.43	2.01	2.16	3.02	3.03	3.17	
	2.21	2.52				1.88	3.48			1.8	2.23

physiologie

transcriptomique



ACTION 4 : Caractérisations
œnologiques



phénologie



Résistance / maladie



Bilan

Action 1

**Implantation des dispositifs
expérimentaux**



Des difficultés ... laisser le temps au temps, le temps de la vigne est long

2016

difficultés de reprise
De Prior / traitement à
l'eau chaude



2017

la saison s'annonçait belle...



août : sécheresse intense,
forte mortalité pour
Artaban,




2018 : obligation de retailler,
complanter, arroser

2019

un dispositif prêt et en
mutation vers de
l'agroécologie zéro
pesticide








Action 2

Caractérisation des variétés

Sensibilité de la culture au vignoble



Capteur non destructive DUALEX




- Feuilles marquées à leur émergence
- Mesures : chlorophylle, anthocyanes, flavonols

3 variétés


- Cabernet Sauvignon
- Prior
- Artaban

4 âges foliaires

- 7 jours
- 10 jours
- 15 jours
- 20 jours




Les mesures traduisent des variations de phénologie et de fonctionnement physiologique :
Chaque variété a ses caractéristiques
Pas forcément de lien avec la défense



Comparaisons
Taille minimale vs espalier

INRA Pech Rouge


Différences de conduite entraînent des modifications physiologiques
(moins de chlorophylle, moins d'azote)
moins de feuilles actives ? Quid de la sensibilité ?




Mesures de diamètres des baies par imagerie



Variations importantes d'évolution de la taille des baies en fonction de la variété



Réponses physiologiques différentes ?



Relations entre expression de gènes de défense,
niveau et type de résistance (**totale** vs **partielle** vs **ontogenique**), stade de
développement (âge feuille vs jours après floraison),
organe (feuilles vs grappes)

Transcriptomique


Puce Neovigen96

10 voies métaboliques impliquées dans la signalisation, défense, métabolisme primaire


Fluidigm

Technique RT qPCR à haut débit
96 échan. X 96 gènes
en une seule étape

96 cDNA samples
96 assays (primer pairs)



9,216 total reaction chambers



Expérimentation feuilles

Au Vignoble




Rameaux suivis Feuilles marquées / âge, Dualex

4 âges foliaires

7 jours
10 jours
15 jours
20 jours

3 variétés

- Cabernet Sauvignon
- Prior
- Artaban



Marquage
début
floraison



Expérimentation grappes



Contamination
oïdium

3 stades phénologiques :

- Flo + 10 jours
- Flo + 15 jours
- Flo + 20 jours




3 variétés

- Cabernet Sauvignon
- Prior
- Artaban

Au labo

Avant
contamination

EXO



Expression
gènes




Au vignoble






24h Après
Contamination

EX1



Sensibilité à l'oïdium



- Pour les trois traits de vie mesurés : **pas de différences entre le cépage sensible (CS) et la variété partiellement résistant (PRI)**
- La variété résistante (**Artaban**) a signif. moins de spores germées sur les feuilles plus âgées (inhibition de la germination)
- L'efficacité d'infection (spores ramifiées) est significativement plus faible pour **Artaban**
- Pas de sporulation pour **Artaban**
- Résistance ontogénique pour les trois cépages marquée pour l'efficacité d'infection

Transcriptomique feuilles

Des gènes marqueurs de variété :


- **Du métabolisme primaire :**
 - Citrate synthase réprimée (**Artaban**)
 - **CAD2** cinnamyl alcool deshydrogénase (synthèse de lignine) surexprimée (**Prior**)

- **De la défense :**
 - **PR3 PR4** (chitinases) (**++ Artaban**)
 - **PR4bis, PR8** (chitinases) (vieilles feuilles variétés résistantes)


Des gènes marqueurs de la **résistance ontogénique**, non spécifiques d'une variété :

- renforcement **paroi** (PER – CALS3), **lipid transfert** (PR14bis)
- **PR protéines**
(CHIT4a- PGIP –PR15 – PR5bis)
- Voie **Phenyl propanoid**

Analyse de la relation entre l'expression des gènes et la maladie par PLS-PM



Partial Least Square Path Modeling



Conclusions transcriptomique

- Des marqueurs cépages dépendant :

- ✓ **Artaban**

- ✓ Surexpression de gènes de PR protéines sur tous les étages foliaires : **PR3** (endochitinase IV), **PR4** (chitinase I II). **PR3 surexprimée de manière constitutive** (sans pathogène) **feuilles et grappes**.
- ✓ **Répression d'un gène du métabolisme primaire CS** (citrate synthase) avec ou sans pathogène **feuilles et grappes**

- ✓ **Prior**

- ✓ Surexpression d'un gène de renforcement des parois cellulaires **CAD2** (cinnamyl alcool deshydrogénase) **feuilles et grappes**.
- ✓ Répression des voies des flavonoïdes et stilbenes au profit de la voie des lignines (**grappes**)
- ✓ Favorise biosynthèse d'Acide salicylique non méthylé (répression SAMT1 surexpression CHORS2) (**grappes**)



Conclusions transcriptomique

- Meilleure compréhension des mécanismes associés à la résistance :
 - ✓ **PR3, PR4** : corrélées à la réduction de sporulation et d'efficacité d'infection
 - ✓ **Glu** (β 1,3 glucanase) : amplification de la résistance en présence du pathogène ?
 - ✓ Autres gènes de la défense basale plus impliqués dans la résistance ontogénique (vieilles feuilles) (PR protéines **PGIP, PR15, PR4bis, PR11**, enzymes clefs de la voie des métabolites secondaires **CHS, Ldox, DFR, F3H**, des voies de l'éthylène **ACO1** et A. Salicylique **SAPB2a**)
- Résistance de **Prior** *in vitro* restreinte aux vieilles feuilles, mais beaucoup plus forte au vignoble, sur feuilles et sur grappes (privilège voies de l'Acide salicylique, synthèse de lignine). Une défense partielle, plus durable ?



Action 3



Evaluation des dispositifs implantés vis-à-vis de maladies

2017-2019 : pas de dégât d'oïdium – mildiou malgré du
zéro traitement et forte pression mildiou
(peu de sporulation)



2019 : forte pression black rot







Pas d'effet variété, ni d'effet 'mélange' sur la répartition du black rot sur l'ensemble du dispositif

Hétérogénéités fortes potentiellement liées à la vigueur

Nécessite des analyses spatiales fines, mais résultats pas aberrants compte tenu de la forte dispersion des ascospores, de sa propension à attaquer des tissus très jeunes en croissance et de l'absence de gènes de résistance dans les deux variétés : black rot à surveiller !



Pas d'effet variété, ni $\alpha \epsilon$.
dispositif

sur la répartition du black rot sur l'ensemble du

Hétérogénéités fortes potentiellement liées à la vigueur

Nécessite des analyses spatiales fines, mais résultats pas aberrants compte tenu de la forte dispersion des ascospores, de sa propension à attaquer des tissus très jeunes en croissance et de l'absence de gènes de résistance dans les deux variétés : black rot à surveiller !



Perspectives


- Poursuite de la caractérisation du système avec les modes de conduites finalisés et la production de raisin et vin « nature »
- Explorer toutes les potentialités pour maintenir le système en zéro pesticide : induction des défenses, étude de la mycorhization du sol et de son rôle dans la limitation de l'azote
- Développement d'indicateurs de biodiversité valorisants pour une gestion « verte » de l'agrosystème
- La gestion de l'enherbement est déjà en évolution pour un agroécosystème zéro pesticide :

2019 : Evolution du Dispositif ANTARES

Résistance
variétale
(2)

Hétérogénéités
spatiales

Conduite
(2)



Ecopaturage

Zéro Pesticide

Biodiversité
(insectes – flore – sol)







Merci pour
votre attention

